

161-49 Couderc

161-49 C

Aptitudes culturales:

- Portainjerto muy generalizado en España por su óptima adaptación a terrenos calizos y por tener una multiplicación fácil y barata.
- Es de vigor medio y proporciona al injerto una producción regular con un ligero adelanto en las fechas de maduración; este vigor más reducido con respecto a otros portainjertos, hace que el desarrollo inicial de las plantas sea más lento.
- Aunque en algunos casos se le ha citado como resistente a la sequía, luego se ha visto que no lo es tanto y que va bien en terrenos arcillosos frescos que no se dessequen excesivamente.
- Su resistencia a la salinidad es nula.
- Es sensible a los nematodos (*Meloidogyne* sp.).
- Los campos de pies madres producen una gran cantidad de madera y enraíza muy bien; el injerto en campo prende bastante bien, pero no tanto el de taller.
- Es muy sensible a la tilosis y se citan muchos casos de formación en estas excrescencias, que impiden la circulación de la savia por los vasos leñosos, provocando una desecación y caída prematura de las hojas en el otoño.
- Un inconveniente importante de este patrón es su similitud morfológica al 5BB que presenta un grave problema con el injerto en campo, ya que la variedad se franquea con facilidad y han aparecido casos de incompatibilidad, además no está adaptado al área mediterránea, sino que es más propio de regiones más septentrionales. Por ello es importante asegurar la identidad varietal cuando se utiliza el 161-49C.



Ampelografía:



Sumidad:

Apertura extremidad	Semiabierta
Pelos postrados de la extremidad	Pigmentación media Densidad media

Pámpano:

Color entrenudo	Rojo en la cara dorsal Verde en la cara ventral
Color nudo	Rojo en la cara dorsal Rojo en la cara ventral
Densidad pelos tumbados	Nula-baja en el nudo Baja en el entrenudo

161-49 Couderc



Hoja joven:

Intensidad antociánica de las 6 hojas terminales	Nula o muy débil
Densidad pelos tumbados	Nula o muy baja entre nervios Baja sobre nervios

Hoja adulta:

Tamaño del limbo	Grande
Forma del limbo	Deltoide
Número de lóbulos	Tres
Disposición lóbulos del seno peciolar	Medio abierto
Hinchazón del haz	Débil
Perfil en sección transversal	Plano
Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores	Profundidad muy superficial con lóbulos abiertos
Pigmentación del haz	Débil
Densidad pelos tumbados entre nervios principales	Nula o muy baja entre nervios
Densidad pelos erguidos sobre nervios principales	Densa sobre nervios
Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo	Peciolo entre más corto y ligeramente más corto que el nervio central, con densidad nula o muy baja de pelos tumbados
Forma y longitud de dientes	Dientes rectilíneos-convexos, de longitud medios y con relación longitud-anchura pequeña-mediana

Hoja adulta:

Color	Marrón amarillento
Relieve superficie	Asurcado