

Selección Oppenheim del Teleki n.º 4

S04

Aptitudes culturales:

- Este patrón se ha ido imponiendo en los últimos tiempos en muchas zonas vitícolas porque confiere a los injertos un desarrollo, una entrada en producción muy rápida y un gran vigor, que es capaz de mantener durante la vida de la plantación, teniendo en cuenta que además favorece la fructificación y adelanta la maduración.
- Es bastante resistente a contenidos elevados de caliza en el suelo, aunque a veces se indica que no es superior al 110 R, adaptándose muy bien en terrenos con subsuelo fresco y húmedo, pero el comportamiento en suelos secos es bastante malo.
- Es sensible a la carencia de magnesio y tiende a agravar los problemas de desecación del raspón.
- Es resistente a los nematodos (*Meloidogyne* sp.).
- Sus campos de pies madres producen mucha madera que enraíza bien. Responde adecuadamente al injerto en campo aunque el de taller no va excesivamente mal.
- En Francia y zonas frescas ha sido considerado como el portainjerto más importante, pero su excesivo vigor, la producción de vinos de calidad mediocre y los problemas de desecación del raspón le convierten en un portainjerto pasado de moda.



Ampelografía:



Sumidad:

Apertura extremidad	Ligeramente abierto
Pelos postrados de la extremidad	Pigmentación nula o muy débil Densidad débil-media

Pámpano:

Color entrenudo	Verde con rayas rojas en la cara dorsal Verde en la cara ventral
Color nudo	Rojo en la cara dorsal Rojo en la cara ventral
Densidad pelos tumbados	Nula o muy baja en nudos Nula o muy baja en entrenudos

S04



Hoja joven:

Intensidad antocianica de las 6 hojas terminales	Nula o muy débil
Densidad pelos tumbados	Nula o muy baja entre nervios Nula o muy baja sobre nervios

Hoja adulta:

Tamaño del limbo	Grande
Forma del limbo	Deltoide
Número de lóbulos	Tres
Disposición lóbulos del seno peciolar	Medio abierto
Hinchazón del haz	Media
Perfil en sección transversal	Forma de V
Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores	Profundidad estre muy superficial-superficial con lóbulos abiertos
Pigmentación del haz	Débil
Densidad pelos tumbados entre nervios principales	Nula o muy baja entre nervios del envés
Densidad pelos erguidos sobre nervios principales	Media sobre nervios del envés
Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo	Peciolo más corto que el nervio central con densidad nula o muy baja de pelos tumbados
Forma y longitud de dientes	Dientes a ambos lados rectilíneos de longitud medios y con relación longitud-anchura mediana

Hoja adulta:

Color	Marrón rojizo
Relieve superficie	Estriado